

Boletín mensual de la  
Estación magnética de Cipolletti  
AGOSTO 2018

## LA ESTACION

La estación magnética de la ciudad de Cipolletti fue instalada a fines de 2015 dentro del predio de la estación meteorológica con el fin de monitorear la intensidad total del Campo Magnético Terrestre en una región precordillerana. Los datos obtenidos en este punto geográfico son de gran interés geomagnético tanto para estudios científicos como para aplicaciones industriales de prospección de recursos naturales, abundantes en la zona. Por lo que, estos registros aportan información de gran relevancia al conocimiento del comportamiento y evolución del campo a nivel local, regional y global, mejorando el modelado del campo a distintas escalas.

Autores: María Inés Gil, Silvana Ricci, Jesús González, Silvina Righetti.

**Coord. Área Geofísica:** Geof. Camila Farías  
[cfarias@smn.gov.ar](mailto:cfarias@smn.gov.ar)

### **Información sobre Copyright**

Este reporte ha sido producido por empleados del Servicio Meteorológico Nacional con el fin de documentar sus actividades de investigación y desarrollo. El presente trabajo ha tenido cierto nivel de revisión por otros miembros de la institución, pero ninguno de los resultados o juicios expresados aquí presuponen un aval implícito o explícito del Servicio Meteorológico Nacional.

La información aquí presentada puede ser reproducida a condición que la fuente sea adecuadamente citada.

## UBICACIÓN

La Estación Magnética Cipolletti se encuentra en la ciudad homónima de la provincia de Río Negro. Sus coordenadas corresponden:

- Coordenadas Geográficas: 38,941°S; 67,978°W
- Altura sobre el nivel del mar: 265 m.



Figura 1: Ubicación de la Estación Cipolletti

## FUNDAMENTOS

La instalación de la estación magnética permanente de Cipolletti permite conocer la evolución espacio-temporal de la intensidad total F del CMT en sitios de interés geomagnético, de ésta manera se podría contribuir con la confección del Modelo Internacional de Campo Geomagnético de Referencia (IGRF)

El SMN cuenta con predios accesibles como lo son las estaciones meteorológicas, en donde éste tipo de estaciones magnéticas se pueden instalar de manera rápida y sencilla, Cipolletti es la primera y ha demostrado ser de fácil manejo.




Figura 2: Modelo del CMT del IGRF

## SELECCIÓN DEL SITIO

Particularmente, Cipolletti se localiza en un sitio de interés geomagnético y geológico, en una zona precordillerana donde la explotación de recursos naturales, como el gas, petróleo y minerales, es la actividad económica principal de la región. Por lo tanto, el registro obtenido es de fundamental importancia en los estudios de prospección de las industrias de petroleras y/o mineras.

El instrumental se localizó en un lugar en donde se encuentra protegido del viento y del sol, cuyas coordenadas son 38°56,45'S, 67°58,7'W. Desde el momento en que se instaló, se comenzaron a registrar valores de referencia del Campo Magnético Terrestre. Por el transcurso de casi un año, en conjunto con el área de Geomagnetismo de la UNLP, los datos obtenidos fueron validados con registros del Observatorio Geomagnético de Trelew, por ser el más cercano a la estación. Los resultados arrojaron que el lugar era el adecuado para el registro de Intensidad del CMT (F).

Luego de dos años de funcionamiento se realizó un nuevo relevamiento magnético del sitio para ubicar la casilla construida especialmente para albergar el instrumento en su interior y protegerlo de los eventos meteorológicos locales, sobre todo de los vientos patagónicos fuertes y las tormentas que inundan el predio. La misma fue construida en su totalidad con materiales no ferromagnéticos, y la mano de obra fue llevada a cabo en colaboración mutua por: Rodolfo Merlino, jefe de la estación meteorológica Cipolletti, Denis Martínez, presidente de la Fundación de Astrónomos Aficionados del Hemisferio Sur, y, María Inés Gil, geóloga encargada de la Estación Magnética Cipolletti.

Por lo tanto, el instrumento fue movido 13 m al S y 4 m al E desde su posición original, dando también buenos resultados en el registro magnético y mostrando una diferencia de aproximadamente 30 nT con respecto a la posición inicial. Esta diferencia aun es motivo de estudio ya que la misma nos permitirá corregir todos los datos obtenidos desde la instalación de la estación a un único sitio de medición.

## INSTRUMENTAL

La intensidad total  $F$  del CMT en ésta Estación se registra con un Magnetómetro de Precesión Protónica, marca Geometrics, modelo G856; cedido por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de la Plata.

El registro del CMT durante más de cien años fue desarrollado con instrumental analógico clásico. En la actualidad, dicho equipamiento está siendo reemplazado por instrumental digital que facilita y mejora la calidad de registro de las componentes del campo magnético terrestre.



*Figura 3: Magnetómetro de Precesión Protónica, Marca Geometrics, Modelo G856*

## OBSERVATORIO MAGNÉTICO OPERATIVO

La sigla adoptada para la Estación es CPL. Se tiene en forma permanente un magnetómetro de precesión protónica, para el registro de  $F$  del CMT. Se trata de un Magnetómetro Geometrics G856, con administración de energía externa. Las baterías utilizadas no afectan el registro magnético, las mismas son de gel, de 12v/7A o 12v/12A, y poseen una autonomía de 2 a 3 semanas aproximadamente.

El registro óptimo del sistema es cada 5 minutos a diferencia del sistema INDIGO de los Observatorios de Pilar y Orcadas que manejan intervalos de medición de 1 minuto. Los datos son almacenados en la memoria del equipo, mientras tenga energía. Por lo que, cada 10-14 días aproximadamente, la serie de datos es descargada a una computadora y la batería intercambiada.




En gabinete los datos son procesados en una planilla Excel y validados constantemente con los registros de  $F$  de la red de Observatorios del país. Se obtienen promedios horarios, mensuales, y anuales. Luego se calculan, utilizando los días calmos establecidos por la IAGA, las curvas de variación diurna para cada mes de registro, y se comparan estos resultados con un índice de actividad geomagnética local, en formatos horarios, trihorarios o diarios.



*Figura 4: Casilla Geomagnética de la Estación CPL*

**REGISTROS**

Se presentan los registros absolutos de F que pudieron obtenerse durante el mes de Agosto de 2018. Aunque se presentan huecos en los registros, debido a inconvenientes electrónicos del instrumento, puede obtenerse un valor mensual correspondiente a casi todos los días del mes. Por lo tanto, se muestra también la variación de F según los promedios mensuales desde Noviembre 2015 hasta la Actualidad.



**Figuras 5 (a,b,c):** Intensidad total del campo magnético en función del tiempo




Figura 6: Variación mensual de la Intensidad total del campo magnético.

## OBSERVACIONES SOLARES

Se muestra una fotografía del Sol tomada el día 31 de Agosto por Denis Martínez, miembro de la Fundación de Astrónomos Aficionados Hemisferio Sur, desde el observatorio astronómico "Tharsis" instalado en la estación. Allí se observan fulguraciones sobre el limbo E-SE.

Las imágenes fueron tomadas utilizando un Telescopio Coronado Solarmax II de 60mm F6/6 (0.7a hidrógeno-alfa de longitud de onda) con una cámara Nikon D90.



## COMENTARIOS FINALES

La actividad solar y geomagnética del mes de agosto se mantuvo en general bajo condiciones tranquilas pero con eventos que pueden reconocerse fácilmente en los magnetogramas de la Estación de Cipolletti.

El primer periodo de perturbación del campo magnético se ve durante los días 15-18 y 19-21, donde a pesar que su amplitud no varía mucho de lo normal, alcanzando aproximadamente los 50 nT, las variaciones a lo largo de los minutos muestran un aspecto muy serruchado que indica que el CMT se encuentra activo. Estas perturbaciones se correlacionan directamente con los cambios de velocidad del viento solar. Según la NOAA, el primer periodo se relacionaría con la llegada del viento proveniente de un agujero coronal y coincidente con una polaridad positiva del campo interplanetario. Así como también un nuevo choque del viento, producto del escape de un agujero coronal pero con polaridad negativa, provocaría las condiciones activas del segundo periodo.

En tanto, el evento más destacado del mes se produce alrededor del día 26, pudiéndose reconocer una tormenta geomagnética clasificada por la NOAA como de niveles G3 (fuerte). Aquí puede observarse que la amplitud de la intensidad total del CMT sobrepasa los 120 nT, más del doble que la media de todo el mes. Este evento se relaciona con el arribo de una Eyección de Masa Coronal despedida por el Sol el día 20. A partir del día 28 el CMT comienza a adquirir condiciones normales nuevamente.

Las condiciones del viento solar (velocidad, densidad de protones, temperatura) durante el mes de Agosto pueden verse en el siguiente link:

<https://www.ngdc.noaa.gov/dscovr/portal/index.html#/vis/summary/1m/1533092400000>

Para mayor información sobre lo abordado, consultar el apartado de conceptos teóricos en:

<http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=vigilancia&id=24>